

EKYFLOGYL

Anti-inflammatoire local

Propriétés

Le diméthylsulfoxyde (DMSO) a un pouvoir de pénétration très élevé et possède également une bonne activité anti-inflammatoire. Excellent solvant, il permet une pénétration cutanée dans le foyer inflammatoire, de la prednisolone, corticoïde anti-inflammatoire, et de la lidocaïne, anesthésique local s'opposant aux phénomènes douloureux et aux réactions locales.

Indications thérapeutiques

Traitement externe des inflammations musculo-squelettiques, traumatiques ou infectieuses :

- Arthrites, périarthrites, arthroses, ostéites,
- Synovites, tares molles,
- Tendinites, elongations et claquages.



Composition

Prednisolone acétate	200 mg	Diméthylsulfoxyde (DMSO)	88 ml
Lidocaïne chlorhydrate	1 g	Excipient q.s.p	100 ml

Posologie et mode d'emploi

Usage externe.

Imbiber la surface correspondant à la lésion en débordant légèrement à l'aide d'un pinceau ou appliquer à l'aide d'une gaze imbibée de produit. Faire deux applications quotidiennes de 10 à 30ml du produit, sans frotter. Poursuivre le traitement jusqu'à guérison, sans toutefois le prolonger au-delà de 12 jours.

Mode d'utilisation

Tourner le bec dans le sens de la flèche pour mettre la pompe doseuse en position de fonctionnement. Refermer après utilisation.

Espèce de destination

Cheval de course, de sport et de loisir.

Contre-indications

Ne pas utiliser EKYFLOGYL sur les sujets atteints d'affections hépatorénales. Ne pas administrer aux chevaux destinés à la consommation humaine.

Présentation

Flacon verre avec pompe doseuse de 125 ml contenant 250 mg de Prednisolone acétate - CIP 6835800. A.M.M n°683 580.0 du 23/04/86. Catégorie : Liste I.

USAGE VÉTÉRINAIRE
A ne délivrer que sur ordonnance.
Respecter les doses prescrites.